

DS Physique 1

Calculatrice interdite, sans document, durée : 2h, Encadrez vos résultats. Toute valeur numérique donnée sans unité sera considérée comme erronée.

EXERCICE 1 – Questions de cours

- Un rayon lumineux qui se propage dans un milieu "0" d'indice n_0 connu arrive sur un dioptre qui sépare le milieu "0" d'un autre milieu "1" d'indice n_1 connu. Donner une condition sur l'angle d'incidence i pour qu'il n'y ait pas de rayon transmis dans le milieu "1".
- On considère une onde électromagnétique $\vec{E}(x,t) = E_0 \vec{u}_z \cos(\alpha(t - \beta x))$. E_0 , α et β sont des grandeurs connues.

- a) Quelle est la fréquence de cette onde ?

$$f = \frac{\alpha}{2\pi}$$

- b) Quelle est la pulsation spatiale (vecteur d'onde) de cette onde ?

$$k = \alpha\beta$$

- c) Quelle est la vitesse de phase de cette onde ?

$$v_\phi = \frac{1}{\beta}$$

- On pose $a = 1 \text{ cm}$. On considère un axe optique horizontal, orienté de la gauche vers la droite. Une lentille mince \mathcal{L} de focale $f' = -3a$ est placée en O . Un point objet est situé en $A = (-2a, 0)$. Un autre point objet est situé en $B = (-2a, +5a)$.

- a) Cette lentille est-elle convergente ou divergente ?

$$f' < 0 \implies \mathcal{L} \text{ est divergente}$$

- b) Déterminer mathématiquement la position de l'image A' du point A . Vous donnerez d'abord votre réponse en fonction de a , puis vous ferez l'application numérique.

$$\text{Loi de conjugaison} \implies \overline{OA'} = \frac{f' \overline{OA}}{f' + \overline{OA}}$$

$$\implies \overline{OA'} = -\frac{6}{5}a$$

$$\implies A' = \left(-\frac{6}{5}a, 0\right)$$

$$\iff A' = (-1.2 \text{ cm}, 0 \text{ cm})$$

- c) De quel côté de la lentille est située cette image ? À gauche de la lentille.

- d) Déterminer mathématiquement la position de l'image B' du point B . Donner une expression en fonction de a , puis faire l'application numérique. On détermine le grandissement grâce à la loi de grandissement d'une lentille :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = +0.6$$

On applique ensuite la définition du grandissement pour trouver $B' = (-1.2a, +3a)$.

$$\Leftrightarrow \boxed{B' = (-1.2 \text{ cm}, 3 \text{ cm})}$$

EXERCICE 2 – Mirages

Les mirages sont des phénomènes optiques dans lesquels l'image d'un objet se reflète comme dans le cas d'une réflexion totale sous l'eau.



FIGURE 1 – Mirage sur de l'asphalt

Un mirage apparaît lorsque la température varie avec l'altitude. L'indice de réfraction de l'air diminue avec la température, si bien qu'un rayon lumineux passant à travers des couches d'air de températures différentes est réfracté et/ou réfléchi. Dans ce problème, on se propose de modéliser ce phénomène. On travaillera avec des angles orientés, le sens positif étant le sens trigonométrique.

On considère le cas où la température est plus élevée à proximité du sol qu'en altitude. On modélise l'air par trois couches d'indices respectifs, n_1 , n_2 et n_3 avec $n_1 > n_2 > n_3$. Ces indices sont supposés connus. Chaque couche a une hauteur h connue. On note i_1 l'angle que fait le rayon incident au dioptre qui sépare n_1 de n_2 . On note I le point d'incidence, et O le point d'intersection entre la normale à ce dioptre et le sol.




FIGURE 2 – modélisation en 3 couches d'air distinctes

1. Reproduire sur votre copie le schéma de la figure 2 et dessiner l'allure de la trajectoire du rayon lumineux, en supposant celui-ci transmis dans les couches d'indice n_2 et n_3 .
2. Lorsque le rayon lumineux arrive sur le dioptre sol, celui-ci forme un angle d'incidence i_3 . Déterminer i_3 en fonction de i_1 et des données.

[]

$$i_3 = \arcsin\left(\frac{n_1 \sin i_1}{n_3}\right)$$

3. Déterminer l'abscisse ℓ du point d'incidence du rayon lumineux sur le sol, en fonction de i_1 et des données, simplifiez au maximum votre expression.

$$\ell = h \tan i_2 + h \tan i_3$$

$$\ell = hn_1 \sin i_1 \left(\frac{1}{\sqrt{n_3^2 - n_1^2 \sin^2 i_1}} + \frac{1}{\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i_1}} \right)$$

4. Tracer la trajectoire des rayons lumineux lorsqu'il y a réflexion totale sur le dioptre $n_2|n_3$.
5. Donner une condition sur l'angle d'incidence i_1 pour que cela soit possible. Donner cette condition en fonction de n_3 et n_1 .

On propose une amélioration du modèle, en introduisant N couches d'air au lieu de simplement 3 couches d'air. Chaque couche est d'indice n_k . On note i_k l'angle d'incidence sur le dioptre $n_k|n_{k+1}$.

6. Montrer que, connaissant l'incidence i_1 d'un rayon d'incidence sur la première couche, $\forall k$, la quantité $S \stackrel{\text{def}}{=} n_k \sin i_k$ est constante.

On admet que si on fait tendre N vers l'infini, cette propriété reste respectée. Autrement dit, si on note z l'altitude d'un point par où passe un rayon lumineux, il existe une grandeur S conservée le long du rayon lumineux :

$$S \stackrel{\text{def}}{=} n(z) \sin i(z)$$

On suppose que la variation d'indice de l'air avec l'altitude z est la suivante :

$$n(z) = n_0(1 + \alpha z)$$

avec $n_0 = 1.0003$ et $\alpha = 2 \times 10^{-6} \text{m}^{-1}$

On s'intéresse au cas limite qui donne lieu à un mirage, c'est à dire lorsqu'un rayon émis en z_0 , vers le sol est petit à petit dévié à chaque passage d'une couche, puis "rase" le sol ($z = 0$) horizontalement avant de revenir vers le haut.

7. Quelle est l'incidence du rayon lumineux lorsqu'il "rase" le sol ? En déduire l'angle d'incidence au moment de l'émission " i_0^{lim} " qui donnera lieu à mirage. Donner votre réponse en fonction de z_0 , l'altitude de l'objet lumineux. Au niveau du sol ($z = 0$), $n = n_0$, $i = \frac{\pi}{2}$ donc :

$$n_0 \sin \frac{\pi}{2} = n(z_0) \sin i_0^{\text{lim}}$$

Soit :

$$n_0 = n_0(1 + \alpha z_0) \sin i_0^{\text{lim}}$$


Soit :

$$i_0^{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{1}{1 + \alpha z_0}\right)$$

Au vu des valeurs numériques, $1/(1 + \alpha z_0) \approx 1$ et l'angle limite est $\pi/2$ autrement dit, seuls les rayons horizontaux peuvent donner lieu à un mirage.

EXERCICE 3 – Prisme quasi rectangulaire

Le prisme d'indice $n = 1.5$ représenté ci-dessous possède un angle \hat{A} proche d'un angle droit. Le but de cet exercice est de montrer que la différence d'angle entre le rayon entrant et le rayon sortant $\delta \stackrel{\text{def}}{=} r_4 - i_1$ est proportionnelle à l'écart par rapport à l'angle droit de \hat{A} .



- On note ϵ la différence entre l'angle \hat{A} et l'angle droit, c'est à dire : $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A} - \frac{\pi}{2}$.
- Les points d'incidences sont notés successivement I_1, I_2, I_3 et I_4 .
- On admet qu'il y a réflexion totale en I_2 et I_3 .
- On note $\hat{C} \stackrel{\text{def}}{=} \widehat{CB, CA}$
- On note $\hat{B} \stackrel{\text{def}}{=} \widehat{BA, BC}$
- Le milieu extérieur est le vide.
- On suppose que les angles i_1 et r_4 sont petits.

On rappelle que pour des "petites" valeurs de x , $\sin x \approx x$

1. Montrer que avec l'approximation mentionnée ci-dessus, $\delta = n(i_4 - r_1)$
2. Trouver une relation simple entre r_1 l'angle réfracté en I_1 , \hat{C} et i_2 l'angle d'incidence en i_2 .

$$\hat{C} + i_2 - r_1 = 0$$

3. Obtenir une relation similaire entre r_3 l'angle de réflexion en I_3 , i_4 , l'angle d'incidence en I_4 et \hat{B}

$$\hat{B} - r_3 + i_4 = 0$$

4. De même, obtenir une relation entre i_2, r_3 et \hat{A}

$$\hat{A} + i_2 - r_3 = 0$$

5. En déduire que $\delta = 2n\epsilon$



$$\begin{aligned} \delta &= n(i_4 - r_1) \\ \implies \delta &= n(r_3 - \hat{B} - (\hat{C} + i_2)) \\ \implies \delta &= n(-\hat{B} - \hat{C} + \hat{A}) \end{aligned}$$

Or $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi \implies -\hat{B} - \hat{C} = \hat{A} - \pi$ Donc :

$$\delta = n(2\hat{A} - \pi) \implies \delta = 2n\epsilon$$

NOM :

1. Déterminer graphiquement la position des images $A'B'$. Tracer au moins trois rayons caractéristiques sur chaque schéma. Indiquer la trajectoire réelle de la lumière en trait plein, et les prolongements en pointillés. Orientez vos rayons avec des flèches. La lumière se propage de la gauche vers la droite.



2. Sur la figure ci-dessous, la trajectoire de deux rayons qui passent à travers un système optique centré stigmatique et aplanétique est indiquée. Positionner les foyers objet et image sur la figure.

